

NESTOR ESSLINGII, *Souancé*.

Prince of Essling's Parrot.

Nestor Esslingii, De Souancé, Rev. et Mag. de Zool. 1856, p. 223.—Gray, List of Spec. of Birds in Coll. Brit. Mus., part iii. sec. 2, *Psittacida*, p. 100.

——— *Novæ-zelandiæ*, Bonap. Rev. et Mag. de Zool. 1854, p. 155.

A SINGLE specimen only of this magnificent Parrot has come under my notice; and this example is perhaps the only one that has yet been sent to Europe. It formerly formed part of the collection of the Prince D'Essling of Paris, but now graces the National Museum of Great Britain. It is in a most perfect state of preservation, and is without exception one of the finest species, not only of its genus, but of the great family of Parrots. The native country of this bird is supposed to be New Zealand; but I, as well as M. de Souancé, have failed to learn anything definite on this point. In size it even exceeds the great Ka-ka (*Nestor hypopolius*), which it resembles in the form of its beak, while in its general colouring it closely assimilates to the *N. productus*; in some features of its plumage, however, it differs from both. In both those species the tail-feathers are strongly toothed on the under surface with red; in the *N. Esslingii* no such marks occur, the toothing on the inner webs of the primaries is not so clear and well defined, and the light-coloured interspaces are more freckled with brown.

As I have treated the subject of the near extinction of this species and its allies rather freely in the description of *N. notabilis*, it will not be necessary to say anything on the subject here.

I need scarcely remark how interesting additional examples of any of these rare Parrots would be to our collections, especially of the present species; second only to which would be a knowledge of the country it inhabits.

I observe M. de Souancé states that he believes the Essling Collection also contained a young specimen of this bird; but having examined the individual to which he refers, and which is now in the British Museum, I am somewhat doubtful as to its belonging to this species.

The following is M. de Souancé's account of this bird, which, as he is the original describer of the species, is given in his own words:—

“NESTOR ESSLINGII, nob. Le Nestor dont nous allons donner la description est, sans contredit, l'oiseau le plus remarquable de la collection Masséna. Intermédiaire entre le *N. hypopolius* et le *N. productus*, ce magnifique Perroquet réunit, dans son plumage, des détails caractéristiques de ces deux espèces.

“Coloration générale semblable à celle du *N. hypopolius*: tout le dessus de la tête gris blanchâtre, les plumes auriculaires jaune orangé très-vif, les joues rouge orangé; les plumes de la poitrine gris cendré, mais largement bordées de brun; une large ceinture d'un blanc jaunâtre règne sur le milieu du ventre; le bas-ventre, les cuisses et les couvertures de la queue rouge brun; bec et pieds de couleur sombre. L. T. 50 cent.; aile 30 cent. Nouvelle-Zélande? Un autre individu, jeune, ressemble tout-à-fait au jeune de l'espèce ordinaire, mais il offre quelques plumes blanches sur l'abdomen, ce qui indique clairement qu'il appartient à cette espèce.

“En comparant cette espèce avec ses deux congénères plus anciennement connus, nous voyons qu'il diffère du *N. hypopolius*, dont, au reste, il est fort voisin, par la coloration plus vive de ses joues et par sa ceinture blanche. Nous signalerons dans le *N. productus*, un fait analogue à celui que nous avons déjà remarqué dans les *Loriculus philippensis*, *L. Regulus*, *L. Bonapartei*; c'est-à-dire, le prolongement excessif de la mandibule supérieure, qui rappelle ce que l'on voit parmi les espèces américaines, chez l'*Enicognathus leptorhynchus*, et pour les Cacatoes, dans le genre *Licmetis*. Ici rien de pareil n'a lieu: le bec entièrement semblable à celui du *N. hypopolius*. M. Gould, dans ses ‘Oiseaux de l'Australie,’ figure un jeune *N. productus*, qui par sa poitrine grise semblerait avoir quelques rapports avec cette espèce et qui s'en éloigne beaucoup cependant par sa tête brune et la forme de son bec. Nous caractérisons donc les trois espèces de *Nestor* de la manière suivante:—1° *N. hypopolius*. Bec grand et fort; dessus de la tête blanc grisâtre; plumes auriculaires et joues faiblement nuancées de jaune et de rouge. 2° *N. Esslingii*. Bec grand et fort; sommet de la tête blanc grisâtre; plumes auriculaires et joues très-vivement colorées de jaune et de rouge orangé; poitrine gris brun, une large ceinture blanc jaunâtre sur l'abdomen. 3° *N. productus*. Bec très-allongé et grêle; sommet de la tête brun; les joues d'un jaune nuancé de rouge; la gorge, la poitrine et les couvertures inférieures des ailes jaune pâle. Ile Philips. Le jeune a la poitrine brune.”

To this list M. Souancé would doubtless have added my *Nestor notabilis*, had he been aware of its existence.

The large figure is of the size of life; the other much reduced.