SYNOPSIS SPECIERUM.

Fam. TROGONIDÆ.—Genus TROGON. *Mœhring et Linné.*

CHAR.: *Rostrum* triangulare, validum, tomiis mandibulæ utriusque serratis. *Nares* setis tectæ. *Alæ* perbreves. *Tarsi* plumosi. *Digiti* antici duo usque ad articulum primum connexi; digiti externi brevissimi.

Caudâ nigrâ, ad apicem albâ, apice quadrato	1. *Mexicanus.*
Facie, capite anticè, auribus, guttureque nigris	2. *elegans.*
Caudæ rectricibus tribus externis ad basin nigris, ad apicem albis, in medio albis maculis parvis numerosis sparsis nigris . . .	3. *ambiguus.*
Rectricibus caudæ tribus externis nigro distinctè fasciatis . .	4. *collaris.*
Capite suprà pectoreque purpureis; corpore subtùs saturatè coccineo	5. *variegatus.*
Capite, collo, pectoreque intensè violaceis; abdomine medio crissoque aurantiacis; rectricibus caudæ tribus externis nigro fasciatis .	6. *caligatus.*
Primariis ad basin albis	7. *atricollis.*
Hæc species genere minima rectricibus caudæ externis nigro latè fasciatis	8. *meridionalis.*
Capite suprà guttureque violaceo-purpureis; abdomine aurantiaco; rectricibus caudæ externis haud fasciatis	9. *melanopterus.*
Capite, gutture, pectoreque nigris, rectricibus caudæ tribus externis notâ quadratâ albâ ad apicem ornatis	10. *melanocephala.*
Abdomine citrino	11. *citreolus.*
Abdomine aurantiaco; rectricibus caudæ tribus externis albis haud fasciatis	12. *aurantius.*
Abdomine coccineo; rectricibus caudæ tribus externis albis haud fasciatis	13. *Surucura.*
Rectricibus caudæ tribus externis nigris, pectore fasciâ albâ carente	14. *Massena.*
Caudâ permagnâ, rectricibus tribus externis nigris . . .	15. *macroura.*
Caudâ mediocri, rectricibus tribus externis nigris . . .	16. *melanura.*

HARPACTES, *Swainson.*

CHAR.: *Rostrum* fortius quam in genere *Trogon* dicto; mandibulis utrisque ad apicem profundè indentatis; tomiis lævibus. *Nares* ex parte denudatæ. *Tarsi* semi-plumosi. *Digiti* antici minùs connexi.

Vertice, gutture, pectoreque nigris; nuchâ coccineâ . . .	1. *Temminckii.*
Rectricibus caudæ tribus externis ad basin nigris, apicem versus nigris albisque marmoratis	2. *Diardii.*
Capite, nuchâ, gutture pectoreque fuliginoso-nigris . . .	3. *Malabaricus.*
Uropygio, caudæque tectricibus superioribus coccineis . . .	4. *Duvaucelii.*
Capite guttureque sordidè sanguineis	5. *erythrocephalus.*
Speciei *Erythrocephalus* dictæ assimilis; differt autem staturâ majore caudâque longiore	6. *Hodgsonii.*
Pectore rosaceo	7. *ardens.*
Capite, gutture, pectoreque lutescentibus	8. *Oreskios.*

APALODERMA, *Swainson.*

CHAR.: *Rostrum* ut in genere *Trogon* dicto; denticulis ferè obsoletis. *Pedes* fortiores; digitis usque ad basin fissis.

Gutture pectoreque viridibus; abdomine coccineo . . .	1. *Narina.*
Gutture flavo	2. *Reinwardtii.*
Pectore, corpore subtùs albo	3. *Gigas?*

TEMNURUS, *Swainson.*

CHAR.: *Rostrum* ut in genere *Trogon* dicto. *Caudæ rectrices* ad apicem furcatæ, apicibus divergentibus.

Gutture pectoreque cineraceo-albis	1. *albicollis.*
Primariis albo fasciatis; ventre rosaceo	2. *roseigaster?*

CALURUS, *Swainson.*

CHAR.: *Rostrum* haud serratum. *Caput* cristâ compressâ ornatâ. *Caudæ tectrices* elongatæ caudamque celantes.

Cristatus; tectricibus superioribus perlongis	1. *resplendens.*
Cristatus; cristâ frontali nares tegente	2. *pulchellus.*
Haud cristatus; caudâ totâ nigrâ; rostro ad basin rubro . .	3. *Pavoninus.*
Rectricibus caudæ tribus externis albo terminatis; rostro olivaceo-corneo	4. *fulgidus.*
Caudâ metallicè cœruleâ; rectricibus utrsique tribus externis ad apicem largè albis	5. *neoxenus.*