

## SYNOPSIS SPECIERUM.

### I. Caudâ breviorē, quadratâ: rostro maximo. *Nigri; gutture caudæque tegminibus discoloribus.*—RAMPHASTOS.

Caudæ tegminibus superioribus flavis.	
Pectore albo.	
Rostro ut plurimum nigro, lateribus compressis . . . . .	1. <i>culminatus</i> .
————— convexis . . . . .	2. <i>Cuvieri</i> .
————— rubro . . . . .	3. <i>erythrorhynchus</i> .
Pectore pallidè lutescente . . . . .	4. <i>citreopygus</i> .
——— flavo . . . . .	5. <i>osculans</i> .
Caudæ tegminibus superioribus albis.	
Pectore albo . . . . .	6. <i>Toco</i> .
——— flavo.	
Rostro pluricolore . . . . .	7. <i>carinatus</i> .
——— obliquè dimidiatim flavo . . . . .	8. <i>Swainsonii</i> .
Caudæ tegminibus superioribus coccineis.	
Rostro nigro.	
Auribus albis . . . . .	9. <i>vitellinus</i> .
——— pectori concoloribus, (sc. flavis) . . . . .	10. <i>Ariel</i> .
Rostro viridescente . . . . .	11. <i>dicolorus</i> .

### II. Caudâ longiore, gradatâ: rostro majore. *Viridescentes; capite, gastræo, tegminibusque caudæ superioribus in plurimis discoloribus.*—PTEROGLOSSUS.

Gastræo bi- vel pluri-colore, coloribus discretis.	
Pectore ventreque flavis, fasciatis.	
Fasciâ ventrali coccineâ, latâ.	
Maxillæ superioris lateribus sordidè albis . . . . .	1. <i>Aracari</i> .
————— obliquè dimidiatis nigris . . . . .	2. <i>castanotis</i> .
Fasciâ ventrali anticè nigrâ posticè coccineâ.	
Pectore maculâ nigrâ notato . . . . .	3. <i>regalis</i> .
——— torque latâ nigrâ cincto . . . . .	4. <i>pluricinctus</i> .
Pectore coccineo.	
Torque pectorali vel nullâ vel angustâ, flavâ . . . . .	5. <i>bitorquatus</i> .
————— latissimâ, nigrâ . . . . .	6. <i>Azaræ</i> .
Pectore ventreque flavis, haud fasciatis.	
Maxillâ superiore dimidiatim flavâ et aurantiacâ . . . . .	10. <i>viridis</i> .
————— flavâ, nigro inscriptâ.	
Maxillâ inferiore nigrâ . . . . .	11. <i>Humboldtii</i> .
————— superiori concolore . . . . .	12. <i>inscriptus</i> .
Pectore gutturi concolore, ventre discolorē.	
Maxillâ superiore nigro maculatâ,	
albescente . . . . .	13. <i>maculirostris</i> .
ut plurimum rubrâ.	
apice concolore . . . . .	14. <i>Nattereri</i> .
——— nigrescente . . . . .	15. <i>Reinwardtii</i> .
Maxillis nigris,	
basin versus rubris . . . . .	16. <i>Culik</i> .
paullum cinerascens . . . . .	17. <i>Langsdorffii</i> .
Gastræo unicolore, vel subunicolore.	
Gastræo stragulo discolorē.	
Gastræo flavo, rubro intermixto . . . . .	7. <i>ulocomus</i> .
——— cœruleo-cano . . . . .	8. <i>hypoglaucus</i> .
——— flavo . . . . .	9. <i>Bailloni</i> .
Gastræo stragulo subconcolore.	
Crisso discolorē.	
Mandibulæ superioris basi flavescente . . . . .	18. <i>prasinus</i> .
————— nigro . . . . .	19. <i>pavoninus</i> .
Crisso concolore.	
Uropygio concolore.	
Rectricum apicibus concoloribus . . . . .	20. <i>sulcatus</i> .
——— intermediarum duarum apicibus castaneis . . . . .	21. <i>Derbianus</i> .
Uropygio coccineo . . . . .	22. <i>hematopygus</i> .