

- б) Раковина заметно удлиненная (вс/д 0,61—0,77, средн. 0,69); килевое ребро покрыто высокими зубчикообразными или иглообразными чешуйками; ребра заднего поля, уплощенные, гладкие, более выдающегося и чешуйчатого, уплощенные, гладкие, разделенные более узкими межреберными промежутками *O. fischeriana*
- 6(36) а) Раковина заметно удлиненная (вс/д 0,66—0,78, средн. 0,71); ребра закилевого поля гладкие *O. praefischeriana*
- б) Раковина от заметно удлиненной до короткой (вс/д 0,75—0,95, средн. 0,85—0,88); ребра заднего поля чешуйчатые *O. kaundensis*
- 8(16) а) Раковина округлая, слабо килеватая 9
- б) Раковина округло- или овально- четырех- или треугольная, трапециевидная, иногда более или менее скошенная, киль от резкого до округлого, явственно выраженный 13
- 9(8a) а) Ребра в прикилевой части переднего поля с дополнительным нитевидным чешуйчатым ребрышком *O. zhizhchenki*
- б) Ребра без дополнительного ребрышка 10
- 10(96) а) На переднем поле до 7—8 тонких ребер или ребра отсутствуют 11
- б) Ребра хорошо выражены на всей поверхности раковины или сглажены лишь в прикилевой части переднего поля 12
- 11(10a) а) 7—8 хорошо развитых передних ребер, покрытых чешуйками *O. michailowi*
- б) Ребра отсутствуют, либо имеется не более 4 едва различимых передних ребер *O. lucinoidea*
- 12(106) а) Ребра острые, угловатые — либо на всей поверхности раковины, либо только в передней части переднего поля *O. gatuevi*
- б) Ребра округло-выпуклые *O. bajarunasi*
- 13(86) а) Задний край зубчатый, раковина не более 16 мм длиной, заднее поле крыловидное, ребра в прикилевой части переднего поля очень слабо заметны *O. acerba*
- б) Задний край гладкий, размеры раковины различны (максимум до 50 мм), заднее поле пологое, крыловидное, или крутое, ребра в прикилевой части переднего поля округло-выпуклые или асимметричные, иногда сглаженные 14
- 14(136) а) Ребра в прикилевой части переднего поля сглаженные, общее число ребер 27—40. Заднее поле крутое 15
- б) Ребра в прикилевой части переднего поля хорошо выраженные или же сглаженные, но при этом случае общее число их не более 35 (24—33). Заднее поле пологое, крыловидное или крутое 17
- 15(14a) а) Раковина от заметно до сильно неравнобокой (дпч/д 0,22—0,35, средн. 0,26), обычно с сильно выдающейся макушкой (вм/вс 0,14—0,25, средн. 0,19), апикальный угол 100—113°, в средн. 105° *O. pseudosemisulcata*

- б) Раковина от заметно до почти равнобокой (дпч/д 0,30—0,46, средн. 0,37—0,40), со слабо выдающейся макушкой (вм/вс 0,05—0,07), апикальный угол 110—137°, обычно 115—132° 16
- 16(156) а) Раковина до 14 мм длины; апикальный угол 125—137°, средн. несколько более 130°; ребра переднего поля либо все гладкие, либо только самые передние 3—6 покрыты чешуйками *O. desperata*
- б) Раковина до 22, иногда до 29 мм длины; апикальный угол 110—120°, средн. 115°; самые передние 8—11 ребер покрыты чешуйками *O. venesta*
- 17(146) а) Заднее поле крыловидное, ребра уплощенные или слабо выпуклые, в передне-нижнем углу створок на внутренней поверхности развито мозолевидное утолщение 18
- б) Заднее поле пологое, крыловидное, или крутое; ребра различного строения 19
- 18(17a) а) Раковина до 50 мм длины, сильно неравнобокая (дпч/д 0,10—0,25); ребра слабо расширяющиеся книзу, гладкие; мозолевидное утолщение слабо развито *O. sarmatica*
- б) Раковина до 30 мм длины, заметно неравнобокая (дпч/д 0,30—0,33); ребра заметно расширяющиеся книзу, самые передние могут быть чешуйчатыми; мозолевидное утолщение хорошо развито *O. karabugasica*
- 19(176) а) На ребрах прикилевой части переднего поля часто отмечается неглубокая тонкая бороздка *O. kishinevensis*
- б) На ребрах нет бороздок 20
- 20(196) а) На передних ребрах имеется дополнительное нитевидное ребрышко *O. karagiensis*
- б) На ребрах нет дополнительного ребрышка 21
- 21(206) а) Раковина до 45 мм длины, с более или менее круто падающим задним полем; ребра в прикилевой части переднего поля асимметричные; на заднем поле обычно 6, редко 7 ребер *O. beaumontiana*
- б) Раковина не более 32 мм длины; заднее поле крыловидное, или более или менее круто падающее; ребра в прикилевой части переднего поля различной формы; на заднем поле 5—12 ребер, чаще 6—7 22
- 22(216) а) Килевой перегиб очень резко выраженный, заднее поле крутое 23
- б) Килевой перегиб нерезкий, но явственно выраженный, заднее поле от круто падающего до полого-крыловидного 24
- 23(22a) а) Макушка заметно выдающаяся (вм/вс 0,11—0,12); апикальный угол 95—110°; заднее поле сильно вогнутое *O. incurvata*
- б) Макушка умеренно выдающаяся (вм/вс 0,06—0,08); апикальный угол 116—130°; заднее поле плоское или слабо вогнутое *O. nalivkini*
- 24(226) а) Макушка обычно сильно выдающаяся (вм/вс 0,13—0,20, средн. 0,17), заднее поле более или менее круто падающее; ребра заднего поля собраны в пучки *O. zalescensis*